

8Н270КЛДМ

СОНЯШНИК



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Ранній середньоолеїновий гібрид придатний до вирощування по системі CLEARFIELD®.
- Має високу толерантність до різних видів несправжньої борошнистої роси.
- Гібрид відзначається високою стійкістю до полягання.
- Чудово підходить для виробництва олії.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

- Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої кількості вологи в ґрунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшення густоти.
- Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
- За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією вирощування.
- Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно. Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості врожаю.
- Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на гектарі.
- Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до способу, часу застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
- Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх умов сівби.
- Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія, відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом. Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.

ДОЗРІВАННЯ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Група стиглості | 2 |
| Днів до цвітіння | 63 |
| Днів до фізіологічної стиглості | 105-110 |

ДОГЛЯД

| | |
|-------------------------------------|---|
| Придатність до загущення посіву | 9 |
| Придатність до пізніх строків сівби | 9 |

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|-----------------------|------------------|
| Висота рослини | 7 |
| Розмір кошика | середній |
| Ступінь нахилу кошика | 9 |
| Положення кошика | напіввертикальне |
| Озерненість кошика | 9 |
| Стійкість до осипання | 9 |

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

| | |
|---------------------------------|---|
| Фомопсис | 8 |
| Іржа | 8 |
| Біла гниль (склеротинія) кошика | 6 |
| Біла гниль (склеротинія) стебла | 6 |
| Вертицильоз | 6 |

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ



Виробництво олії

*™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

*CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. **™
Завжди читайте та дотримуйтеся вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com



8X288КЛДМ

СОНЯШНИК



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високоолеїновий гібрид придатний до технології CLEARFIELD®.
- Рослина середньої висоти. Має генетичну стійкість до більшості видів неспаравжньої борошнистої роси.
- Гібрид відзначається гарним потенціалом урожайності насіння з високим виходом олії.
- Достигання рослин відбувається одночасно та швидко.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

- Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої кількості вологи в ґрунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшення густоти.
- Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
- За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією вирощування.
- Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно. Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості врожаю.
- Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на гектарі.
- Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до способу, часу застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
- Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх умов сівби.
- Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати посіву. n/a - недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія, відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом. Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.

ДОЗРІВАННЯ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Група стиглості | 2 |
| Днів до цвітіння | 65 |
| Днів до фізіологічної стиглості | 105-110 |

ДОГЛЯД

| | |
|-------------------------------------|---|
| Придатність до загущення посіву | 7 |
| Придатність до пізніх строків сівби | |

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|-----------------------|------------------|
| Висота рослини | 7 |
| Розмір кошика | середній |
| Ступінь нахилу кошика | 8 |
| Положення кошика | напіввертикальне |
| Озерненість кошика | 8 |
| Стійкість до осипання | 8 |

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

| | |
|---------------------------------|---|
| Фомопсис | 7 |
| Іржа | 8 |
| Біла гниль (склеротинія) кошика | 7 |
| Біла гниль (склеротинія) стебла | 6 |
| Вертицильоз | 8 |

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ



Виробництво олії з високим вмістом олеїнової кислоти.

*™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

*CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. *™
Завжди читайте та дотримуйтеся вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com



8X341КЛДМ

СОНЯШНИК



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Середньоранній високоолеїновий гібрид придатний до технології CLEARFIELD®.
- Рослина середньої висоти. Має високу стійкість до полягання.
- Гібрид відзначається гарним потенціалом урожайності насіння з високим виходом олії.
- Достигання рослин відбувається одночасно та швидко.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

- Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої кількості вологи в ґрунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшення густоти.
- Здійсніть висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
- За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією вирощування.
- Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно. Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості врожаю.
- Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на гектарі.
- Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до способу, часу застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
- Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх умов сівби.
- Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати посіву. n/a - недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія, відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом. Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.

ДОЗРІВАННЯ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Група стиглості | 3 |
| Днів до цвітіння | 66 |
| Днів до фізіологічної стиглості | 110-115 |

ДОГЛЯД

| | |
|-------------------------------------|---|
| Придатність до загущення посіву | 7 |
| Придатність до пізніх строків сівби | |

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|-----------------------|------------------|
| Висота рослини | 7 |
| Розмір кошика | середній |
| Ступінь нахилу кошика | 8 |
| Положення кошика | напіввертикальне |
| Озерненість кошика | 8 |
| Стійкість до осипання | 8 |

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

| | |
|---------------------------------|---|
| Фомопсис | 7 |
| Іржа | 8 |
| Біла гниль (склеротинія) кошика | 7 |
| Біла гниль (склеротинія) стебла | 7 |
| Вертицильоз | 8 |

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ



Виробництво олії з високим вмістом олеїнової кислоти.

*™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

*CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. **™
Завжди читайте та дотримуйтеся вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com



8Н358КЛДМ

СОНЯШНИК



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Середньоранній гібрид з найбільшим вмістом олії в серії гібридів CLEARFIELD®.
- Гібрид середньої висоти з високою стійкістю до вилягання.
- Відмінний стартовий ріст.
- Відмінні якості високоврожайного гібриду.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

- Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої кількості вологи в ґрунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшення густоти.
- Здійсніть висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
- За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією вирощування.
- Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно. Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості врожаю.
- Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на гектарі.
- Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до способу, часу застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
- Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх умов сівби.
- Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати посіву. n/a - недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія, відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом. Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.

ДОЗРІВАННЯ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Група стиглості | 3 |
| Днів до цвітіння | 67 |
| Днів до фізіологічної стиглості | 110-115 |

ДОГЛЯД

| | |
|-------------------------------------|---|
| Придатність до загущення посіву | 7 |
| Придатність до пізніх строків сівби | 8 |

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|-----------------------|------------------|
| Висота рослини | 7 |
| Розмір кошика | середня |
| Ступінь нахилу кошика | 7 |
| Положення кошика | напіввертикальне |
| Озерненість кошика | 8 |
| Стійкість до осипання | 8 |

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

| | |
|---------------------------------|---|
| Фомопсис | 7 |
| Іржа | 8 |
| Біла гниль (склеротинія) кошика | 7 |
| Біла гниль (склеротинія) стебла | 6 |
| Вертицильоз | 8 |

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ



Виробництво олії

*™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

*CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. **™
Завжди читайте та дотримуйтеся вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com



ІЛОНА КЛ


СОНЯШНИК



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високоолеїновий гібрид стійкий до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®.
- Має дружні сходи, цвітіння та дозрівання.
- Гібрид відзначається високою пластичністю до умов вирощування.
- Високий вміст олії в насінні

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



9 = відмінно, 1 = недостатньо

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

- Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загорання насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої кількості вологи в ґрунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшення густоти.
- Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
- За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією вирощування.
- Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно. Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості врожаю.
- Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на гектарі.
- Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до способу, часу застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
- Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх умов сівби.
- Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати посіву. n/a – недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія, відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом. Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.

ДОЗРІВАННЯ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Група стиглості | 3 |
| Днів до цвітіння | 66 |
| Днів до фізіологічної стиглості | 115-120 |

ДОГЛЯД

| | |
|-------------------------------------|---|
| Придатність до загущення посіву | 8 |
| Придатність до пізніх строків сівби | - |

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|-----------------------|------------------|
| Висота рослини | 7 |
| Розмір кошика | середній |
| Ступінь нахилу кошика | 7 |
| Положення кошика | напіввертикальне |
| Озерненість кошика | 8 |
| Стійкість до осипання | 8 |

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

| | |
|---------------------------------|---|
| Фомопсис | 7 |
| Іржа | 8 |
| Біла гниль (склеротинія) кошика | 6 |
| Біла гниль (склеротинія) стебла | 6 |
| Вертицильоз | 8 |

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ



Виробництво олії
Високоолеїнова програма виробництва корисної для здоров'я людини олії.

*™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

*CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. **™
Завжди читайте та дотримуйтеся вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com



8Н421КЛДМ

СОНЯШНИК



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Середньостиглий гібрид в серії гібридів CLEARFIELD®.
- Гібрид має потужну кореневу систему та стійкий від вилягання.
- Вирівняний, одночасне цвітіння та досягання формув відмінні показники урожаю.
- Має високий вихід олії.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

- Важливу роль в вирощуванні грає дотримання необхідних умов. Слідкуйте за оптимальними строками посіву та контролюйте глибину загортання насіння. Рекомендується сіяти на глибину до 4 см за наявності достатньої кількості вологи в ґрунті. Насіння можна сіяти на глибину 6 см за посушливих умов, але очікуйте пізніх сходів та зменшення густоти.
- Здійснюйте висів в оптимальні для вашого регіону строки. Переконайтеся в тому, що група стиглості гібрида відповідає даті сівби.
- За використання нульової технології, необхідно збільшувати густоту рослин на 5-10 відсотків у порівнянні з традиційною технологією вирощування.
- Господарі мають відслідковувати поля на наявність шкідників та використовувати необхідні інсектициди та фунгіциди, якщо це необхідно. Економічний поріг залежить від зараження, вартості пестицидів та вартості врожаю.
- Соняшник треба збирати своєчасно для оптимізації кількості врожаю на гектарі.
- Гібрид розроблений для використання в системі CLEARFIELD®. Гібриди CL є стійкими до застосування гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ®. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці, де вказані рекомендації що-до способу, часу застосування, обмеження та норми витрати гербіциду.
- Добре підходить для пересіву втрачених посівів та толерантний до пізніх умов сівби.
- Найкраща продуктивність гібрида створюється за умов формування густоти 60-65 тис. рослин на гектар.

Оцінка: Dow Seeds використовує таку шкалу оцінювання: 9=Відмінно, 1=Погано. Висота рослини оцінюється за такою шкалою: 9=Коротка, 1=Довга. Кількість днів до цвітіння та кількість днів до стиглості вираховується з дати посіву. n/a - недостатньо даних. Фактичні оцінки базуються на найкращій доступній поточній інформації, і на них може впливати зміна стану навколишнього середовища. Dow Seeds гарантує, що насіння, яке продає компанія, відповідає опису на наданих етикетках в межах допустимого відхилення, встановленого або дозволеного законом. Ця гарантія виключає та замінює всі інші гарантії, явні або уявні, включно з будь-якою гарантією придатності до продажу або придатності до певного призначення, які таким чином не визнаються.

ДОЗРІВАННЯ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Група стиглості | 4 |
| Днів до цвітіння | 69 |
| Днів до фізіологічної стиглості | 120-125 |

ДОГЛЯД

| | |
|-------------------------------------|---|
| Придатність до загущення посіву | 7 |
| Придатність до пізніх строків сівби | - |

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|-----------------------|------------------|
| Висота рослини | 7 |
| Розмір кошика | середня |
| Ступінь нахилу кошика | 7 |
| Положення кошика | напіввертикальне |
| Озерненість кошика | 8 |
| Стійкість до осипання | 8 |

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

| | |
|---------------------------------|---|
| Фомопсис | 7 |
| Іржа | 8 |
| Біла гниль (склеротинія) кошика | 6 |
| Біла гниль (склеротинія) стебла | 6 |
| Вертицильоз | 8 |

РИНКОВА МОЖЛИВІСТЬ



Виробництво олії

*™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

*CLEARFIELD і логотип CLEARFIELD є торговою маркою BASF Corporation. **™
Завжди читайте та дотримуйтеся вказівок на етикетці.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com



КУКУРУДЗА

MT 261



Тип гібрида
 Група стиглості
 Тип зерна

Простий
 ФАО 250
 Зубоподібний

ОСОБЛИВОСТІ

Розвиток на ранніх етапах
 Висота рослини
 Висота кріплення качана
 Коренева система
 Міцність стебла
 Ремонтантність
 Посухостійкість

дня
 середньо-висока, від 240 до 270 см
 середня, 110-120 см
 відмінна
 дуже добра
 дуже добра
 відмін

СТРОКИ СІВБИ

Дуже ранні
 Ранні
 Середні
 Пізні

допустимі
 оптимально підходить
 оптимально підходить
 не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ

Низька
 Середня
 Висока
 Дуже висока

не рекомендується
 оптимально підходить
 оптимально підходить
 допустима

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рядків у качані
 Кількість зерен у ряді
 Вологовіддача
 Маса 1000 насінин, грам
 Рекомендована густина рослин,
 тис. шт./га
 Потенціал урожайності, т/га

16-18
 28-42
 дуже добра
 290-330
 Степ - 50-55, Лісостеп - 55-80,
 Поліся 80-90
 16




®™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
 Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
 Факс: +38 044 289 20 41
 E-mail: mkuziura@dow.com
 E-mail: mshepelya@dow.com





Тип гібрида Простий
 Група стиглості ФАО 250
 Тип зерна Кременистоподібний

ОСОБЛИВОСТІ

Розвиток на ранніх етапах добрий
 Висота рослини довга, від 200 до 240 см
 Висота кріплення качана середня, 90-110 см
 Коренева система дуже добра
 Міцність стебла дуже добра
 Ремонтантність добра
 Посухостійкість добра

СТРОКИ СІВБИ

Дуже ранні допустимі
 Ранні оптимально підходить
 Середні оптимально підходить
 Пізні не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ

Низька не рекомендується
 Середня оптимально підходить
 Висока оптимально підходить
 Дуже висока допустима

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рядків у качані 14-16
 Кількість зернен у ряді 28-42
 Вологовіддача дуже добра
 Маса 1000 насінин, грам 280-320
 Рекомендована густина рослин,
 тис. шт./га Степ - 50-65, Лісостеп - 65-80,
 Поліся 80-90
 Потенціал урожайності, т/га 14

*™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
 Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
 Факс: +38 044 289 20 41
 E-mail: mkuziura@dow.com
 E-mail: mshepelya@dow.com



КУКУРУДЗА



МТ Матадо

| | |
|-----------------|--------------|
| Тип гібрида | Простий |
| Група стиглості | ФАО 380 |
| Тип зерна | Зубоподібний |

ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Розвиток на ранніх етапах | середня |
| Висота рослини | середньо-висока, від 260 до 280 см |
| Висота кріплення качана | середня, 110-120 см |
| Коренева система | дуже добра |
| Міцність стебла | добра |
| Ремонтантність | добра |
| Посухостійкість | відмінна |

СТРОКИ СІВБИ

| | |
|------------|----------------------|
| Дуже ранні | не рекомендується |
| Ранні | оптимально підходить |
| Середні | оптимально підходить |
| Пізні | не рекомендується |

ГУСТОТА СІВБИ

| | |
|-------------|----------------------|
| Низька | оптимально підходить |
| Середня | оптимально підходить |
| Висока | не рекомендується |
| Дуже висока | не рекомендується |

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------------------------|
| Кількість рядків у качані | 14-16 |
| Кількість зерен у ряді | 26-44 |
| Вологовіддача | добра |
| Маса 1000 насінин, грам | 300-350 |
| Рекомендована густина рослин, тис. шт./га | Степ - 40-45, Лісостеп - 50-55 |
| Потенціал урожайності, т/га | 18 |



®™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
Факс: +38 044 289 20 41
E-mail: mkuziura@dow.com
E-mail: mshepelya@dow.com



Да Сонка

КУКУРУДЗА



Тип гібрида Простий
 Група стиглості ФАО 350
 Тип зерна Зубоподібний

ОСОБЛИВОСТІ

Розвиток на ранніх етапах середня
 Висота рослини середньо-висока, від 220 до 275 см
 Висота кріплення качана середня, 110-125 см
 Коренева система відмінна
 Міцність стебла дуже добра
 Ремонтантність дуже добра
 Посухостійкість дуже добра

СТРОКИ СІВБИ

Дуже ранні допустимі
 Ранні оптимально підходить
 Середні оптимально підходить
 Пізні не рекомендується

ГУСТОТА СІВБИ

Низька не рекомендується
 Середня оптимально підходить
 Висока оптимально підходить
 Дуже висока допустима

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рядків у качані 16-18
 Кількість зерен у ряді 28-44
 Вологовіддача дуже добра
 Маса 1000 насінин, грам 300-350
 Рекомендована густина рослин,
 тис. шт./га Степ - 50-65, Лісостеп - 65-80,
 Поліся 80-90
 Потенціал урожайності, т/га 18



®™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
 Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
 Факс: +38 044 289 20 41
 E-mail: mkuziura@dow.com
 E-mail: mshepelya@dow.com



Да Сібоні

КУКУРУДЗА



Тип гібрида
 Група стиглості
 Тип зерна

Простий
 ФАО 430
 Зубоподібний

ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Розвиток на ранніх етапах | середня |
| Висота рослини | середньо-висока, від 240 до 270 см |
| Висота кріплення качана | середня, 110-120 см |
| Коренева система | дуже добра |
| Міцність стебла | дуже добра |
| Ремонтантність | дуже добра |
| Посухостійкість | дуже добра |

СТРОКИ СІВБИ

| | |
|------------------|----------------------|
| Дуже ранні | не рекомендується |
| Ранні | оптимально підходить |
| Середні | оптимально підходить |
| Пізні | не рекомендується |

ГУСТОТА СІВБИ

| | |
|-------------------|----------------------|
| Низька | не рекомендується |
| Середня | оптимально підходить |
| Висока | оптимально підходить |
| Дуже висока | допустима |

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Кількість рядків у качані | 16-18 |
| Кількість зерен у ряді | 28-44 |
| Вологовіддача | дуже добра |
| Маса 1000 насінин, грам | 300-340 |
| Рекомендована густина рослин, тис. шт./га | Степ - 50-55, Лісостеп - 65-80, Поліся 80-90 |
| Потенціал урожайності, т/га | 18 |



®™ торгова марка Dow AgroSciences LLC
 Dow Seeds є торговою маркою Dow Chemical Company.

www.dowseeds.eu/ua

Наш офіс в Україні:
9/2, вул. Велика Васильківська, офіс 72
01004, Київ

Тел.: +38 044 289 20 40
 Факс: +38 044 289 20 41
 E-mail: mkuziura@dow.com
 E-mail: mshepelya@dow.com

