

15.2.2012**Тому, кого это касается**

Доводим к Вашему сведению, что препарат компании Cheminova A/S Винцит 050 SC, к.с. содержит в своей основе два химических вещества фунгицидного действия и не проявляет отрицательного действия на бактерии, в т.ч. Rizobium. Препарат Винцит 050 SC, к.с. зарегистрирован и рекомендован для протравки семян бобовых культур, при выращивании которых используются инокулянты.

При проведении обработки семян препаратом и аппликации инокулянтом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- Инокулянты, содержащие добавку «удлинитель», имеют значительно более продолжительный интервал между нанесением и посевом. Семена, обработанные инокулянтом без «удлинителя», должны быть высеяны как можно скорее после обработки (в течение 12 часов или менее), чтобы клетки бактерий остались влажными и могли сохранять жизнеспособность достаточно долго.
- Семена, обработанные препаратом с «удлинителем», могут храниться до 30 дней перед посевом, в зависимости от продукта и от наличия тех или иных фунгицидов, что позволяет производить обработку заблаговременно до посева.
- При внесении фунгицида или при использовании семян, обработанных фунгицидом, прежде чем делать аппликацию инокулянта, **убедитесь, что фунгицид высох**. Поэтому обработку семян протравителем необходимо произвести заблаговременно (2-3 недели).
- При загрузке сеялки со шнеком жидкие или сухие материалы для инокуляции необходимо добавлять в семена

на входе в шнек — для более качественного нанесения. Сначала определите уровень прохождения семян через шнек — взвесьте, сколько семян проходит через него за 30 сек. Затем вычислите количество инокулянта, необходимого для такого количества семян, и установите аппликатор инокулянта так, чтобы он выдавал соответствующее количество материала за 30 секунд.

CHEMINOVA A/S